

**Instituto Superior de Economia e Gestão**

**ANÁLISE MATEMÁTICA II**

Licenciatura MAEG

**Época Normal** - 11 de Junho de 2013

Duração: 2h

**I**

Considere a função  $f$  cujo desenvolvimento em série de potências de  $x - 1$  é

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{n^{n+1}}{(n!)^2} (x - 1)^n .$$

- a) **(1,5)** Indique o intervalo de convergência da série.
- b) **(1,5)** Calcule o valor de  $f^{(280)}(1)$ , justificando convenientemente.

**II**

Considere a função  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{y - |y|} - \sqrt{-\log(x^2 + y^2)}}{e^{\sqrt{|x| - y}}} .$$

- a) **(1,5)** Determine o domínio  $D_f$  da função  $f$  e represente-o graficamente.
- b) **(0,5)** Determine todos os valores de  $\epsilon > 0$  para os quais seja verdadeira a frase,  $D_f \subset B_\epsilon((0, 0))$ , e traduza o seu significado.
- c) **(1,0)** Dê exemplo de uma sucessão de pontos que pertença a  $D_f$  cujas componentes não sejam constantes e que convirja para um ponto que não pertença a  $D_f$ .
- d) **(1,0)** Com base nas alíneas anteriores justifique se  $D_f$  pode ser um conjunto compacto.

**III**

Seja a função  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x(y-1)^2}{x^2 + (y-1)^2} & \text{se } y \neq 1 \\ kx & \text{se } y = 1 \end{cases} .$$

- a) **(1,5)** Discuta a continuidade da função  $f$  nos pontos da forma  $(a, 1)$  com  $a \in \mathbb{R}$ , em função do parâmetro real  $k$ .

- b) (1,5)** Para que vectores não nulos  $u \in \mathbb{R}^2$ , é que a derivada direccional  $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 1)$  não depende do valor de  $k$ ?
- c) (1,5)** Para  $k = 1$ , estude a diferenciabilidade da função  $f$  no ponto  $(0, 1)$ .

#### IV

Considere a função

$$f(x, y) = \log \frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - 2ay^2.$$

- a) (2,0)** Determine os pontos críticos de  $f$  e classifique-os em função de  $a \neq 0$ .
- b) (1,5)** Justifique se a função tem extremantes no conjunto

$$A = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 2)^2 + (y - 2)^2 \leq 1 \wedge y \geq x \right\}.$$

#### V

Considere a função  $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $u(x, y) = y^2 - xy - x^2$ , e seja  $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ , uma função inteira.

- a) (1,5)** Determine  $f(z)$  tal que  $f(i) = 1$ .
- b) (1,0)** Determine  $f'(i)$ .

#### VI

**(2,5)** Mostre que se  $f$  e  $\bar{f}$  são ambas funções inteiras, então  $f$  é constante.

fim