

Época Normal-2º semestre 2013/2014- 5 Junho de 2014

- 1.a)  $A = ]-2, -\sqrt{3}[ \cup ]-1, \sqrt{3}[$ ;
- 1.b) máximo é  $e^{1/2}$ ; mínimo é  $e^{-1}$ ;  $B$  não é compacto porque não é fechado ( $ad(B) \neq B$ );
- 1.c)  $fr(A \cap \mathbb{Q}) = [-2, -\sqrt{3}] \cup [-1, \sqrt{3}]$ ;  $int(A \cap \mathbb{Q}) = \emptyset$
- 1.d) prop. verd. ( $1 \in fr(B)$ )
- 2.a)  $e^2$ ;
- 3.a)  $a = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ;
- 3.b)  $a = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ;
- 3.c)  $+\infty$ ;
- 4.a)  $g(-1) = 0$  e  $g(x) > 0$ , para todo  $x \neq -1$ ;
- 4.b)  $y = 0$ ;
5. Pontos impróprios: 0 e 2; para estudar o integral no ponto 0 comparar com  $\int_0^1 \frac{1}{x^{2\alpha-1}} dx$ , q dá convergente sse  $\alpha < 1$ ; para estudar o integral no ponto 2 comparar com  $\int_1^2 \frac{1}{(2-x)^{\alpha-2}} dx$ , q dá convergente sse  $\alpha < 3$ ; Portanto integral dado é convergente para  $0 < \alpha < 1$ ;
6. Considerando a função auxiliar  $g(x) = \int_a^x f(t)dt - \frac{1}{2} \int_a^b f(t)dt$  o que temos que provar é que existe  $c \in [a, b]$  tal que  $g(c) = 0$ ;
- Como  $g(a) = \int_a^a f(t)dt - \frac{1}{2} \int_a^b f(t)dt = -\frac{1}{2} \int_a^b f(t)dt$  e  $g(b) = \int_a^b f(t)dt - \frac{1}{2} \int_a^b f(t)dt = \frac{1}{2} \int_a^b f(t)dt$  basta notar que ou  $g(a) = g(b) = 0$  (e consideremos  $c = a$  ou  $c = b$ ) ou temos  $g(a).g(b) < 0$  (têm sinais contrários) e portanto, pelo teorema de Bolzano aplicado à função  $g$ , sai o resultado;