

## EXERCÍCIOS ADICIONAIS CAPÍTULO 2

1. Seja o espaço  $\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ . Neste espaço, a probabilidade de cada acontecimento  $A \subset \Omega$  é proporcional à área da figura plana correspondente à imagem de  $A$ . Seja  $U[(x, y)]$  a variável aleatória definida pela distância do ponto  $(x, y)$  à origem,  $(0, 0)$ .
  - a) Determine a função de distribuição da variável aleatória  $U$  no espaço  $\Omega$ .
  - b) Calcule  $P(0.2 < U < 0.5)$  e  $P(U > 0.5 | U > 0.2)$ .
  - c) Classifique a variável aleatória  $U$ .

2. Seja

$$F(x) = \begin{cases} 0 & (x < 1) \\ x/3 & (1 \leq x < 2) \\ 1 & (x \geq 2). \end{cases}$$

- a) Verifique que se trata de uma função de distribuição.
  - b) Classifique a variável aleatória em causa.
3. Um saco tem  $n$  bolas brancas ( $B$ ) ( $n > 10$ ) e apenas uma de cor preta ( $P$ ). São extraídas bolas sem reposição até sair a de cor preta. Seja  $X$  a variável aleatória que representa o número de extracções feitas.
    - a) Qual a imagem do acontecimento  $A = \{P, BP, BBP, BBBP\}$ ?
    - b) Qual a imagem inversa do intervalo  $(0, 5)$ ?
    - c) Classifique a variável aleatória e obtenha a sua função de distribuição.
    - d) Qual a probabilidade de ser necessário extrair mais de três bolas?
  4. Calcule o valor de  $k$  de modo que as funções dadas nas alíneas seguintes definam funções probabilidade da variável aleatória  $X$ .
    - a)  $f(x) = kx$  ( $x = 1, 2, \dots, 10$ );
    - b)  $f(x) = k \left(\frac{1}{5}\right)^x$  ( $x = 1, 2, 3, \dots$ ).

5. Seja  $X$  uma variável aleatória com função densidade

$$f(x) = x^{-3}/2 \quad (x > 1/2).$$

- a) Obtenha a função de distribuição de  $X$ .
  - b) Calcule  $P(X > 4 | X > 2)$ .
6. A quantidade de vinho (em dezenas de litros) que um produtor-engarrafador vende por dia é uma variável aleatória  $X$  com função de distribuição

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ \frac{x^2}{50} & (0 \leq x < 5) \\ \frac{20x - x^2}{50} - 1 & (5 \leq x < 10) \\ 1 & (x \geq 10). \end{cases}$$

- a) Determine a função densidade.
  - b) Do conjunto dos dias em que vende mais que 50 litros, qual a probabilidade de vender menos que 90 litros?
  - c) Se o ganho líquido diário for  $Y = 2X - 6$ , calcule a função de distribuição do ganho líquido e a proporção de dias em que há prejuízo.
7. O tempo de reparação, em dezenas de horas, de certo tipo de avarias em computadores é uma variável aleatória com função densidade

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & (x > 0) \\ 0 & (\text{outros } x). \end{cases}$$

- a) Determine a função de distribuição da variável aleatória  $X$ .
  - b) Que limite superior, para o tempo de reparação, pode ser estabelecido em 40% dos casos?
  - c) Está instituído na empresa um sistema de prémios que atribui €20 aos trabalhadores que façam uma reparação em menos de 5 horas, e de €10 se demorar entre 5 e 8 horas. Obtenha a distribuição da variável aleatória que representa o prémio atribuído.
8. Classifique as afirmações abaixo de verdadeiras ou falsas, justificando sucintamente.
- a) Se  $f$  é a função probabilidade de uma variável aleatória discreta, então, qualquer que seja  $x \in \mathfrak{R}$ ,  $0 \leq f(x) \leq 1$ .
  - b) Se  $f$  é a função densidade de uma variável aleatória contínua, então, qualquer que seja  $x \in \mathfrak{R}$ ,  $0 \leq f(x) \leq 1$ .
  - c) Se  $F$  é a função de distribuição de uma variável aleatória contínua, então, qualquer que seja  $x \in \mathfrak{R}$ ,  $0 \leq F(x) \leq 1$ .
  - d) Se  $X$  é uma variável aleatória contínua, então a sua função densidade é sempre menor ou igual a um.
  - e) Se  $X$  é uma variável aleatória contínua e simétrica em relação à origem, com função de distribuição  $F$ , então  $F(x) = 1 - F(-x)$ .
9. Seja  $F$  a função de distribuição de uma variável aleatória  $X$ . Classifique as afirmações abaixo de verdadeiras ou falsas, justificando sucintamente.
- a) Sendo  $a$  e  $b$  reais tais que  $a < b$  e  $F(b) > 0$ , então  $P(X \leq a | X \leq b) = 1$ .

- b) Seja  $X$  uma variável aleatória contínua e simétrica em relação à origem e  $k$  uma constante real positiva. Então,  $P(-k < X < k) = 2F(k) - 1$ .
- c)  $X$  é uma variável aleatória mista. Seja  $a \in \mathfrak{R}$  um ponto de continuidade de  $F(x)$ . Então  $F(a) = 1 - P(X \geq a)$ .
- d) Quaisquer que sejam  $x, h > 0 \in \mathfrak{R}$ ,  $F(x) < F(x+h)$ .
- e) Considere a variável aleatória  $X$  discreta. Sendo  $Y = 1 - X$ , então a função distribuição de  $Y$  é dada por  $G(y) = 1 - F(y)$ .

10. O tempo de fabricação de uma dada peça, em horas, é uma variável aleatória  $X$  com a seguinte função densidade

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & 1 < x < 2 \\ 3-x & 2 < x < 3 \end{cases}$$

- a) Calcule a função de distribuição de  $X$ .
- b) Sabendo que uma certa peça já está a ser fabricada há duas horas calcule a probabilidade de ainda ter de esperar pelo menos mais meia hora até à sua conclusão.
- c) Se o custo de cada peça ( $C$ ) for calculado através da expressão:  $C = 20 + 25X$ , determine a distribuição dessa variável.

11. Numa dada loja de componentes para computadores, as vendas diárias de discos rígidos das marcas  $X$  e  $Y$  têm a seguinte função probabilidade conjunta:

$y \setminus x$	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>0</b>	0.12	0.25	0.13
<b>1</b>	0.05	0.30	0.01
<b>2</b>	0.03	0.10	0.01

- a) Determine as funções de distribuição marginais de  $X$  e de  $Y$ .
- b) Qual a probabilidade de, num dia, a marca  $X$  ser a mais vendida?
- c) Qual a proporção de dias em que se vende igual número de discos das marcas referidas?
- d) Obtenha a função probabilidade de  $X$ , nos dias em que se vende exactamente um disco da marca  $Y$ .
- e) Verifique se as variáveis são independentes.

12. Seja  $(X, Y)$  uma variável aleatória que representa o número de leitores de MP3 das marcas  $A$  e  $B$ , respectivamente, vendidos diariamente numa loja, com função probabilidade conjunta dada por

$y \setminus x$	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>0</b>	$a$	0.06	0.04
<b>1</b>	0.09	$b$	0.01
<b>2</b>	0.05	0.02	0.01

- a) Calcule  $f_{Y|X=2}(y)$  e comente o seu significado.
- b) Sabendo que em 80% dos dias não se vendem leitores da marca A, determine o valor das constantes  $a$  e  $b$ , bem como a probabilidade de, nessa loja, se venderem mais de 2 leitores de MP3 de marca A num dia.
- c) Determine a função de distribuição do total de leitores de MP3 vendidos diariamente nessa loja.

13. A função probabilidade conjunta de  $(X, Y)$  é dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{x+y}{32} \quad (x=1, 2; y=1, 2, 3, 4).$$

- a) Obtenha as funções probabilidade marginais de  $X$  e de  $Y$ .
  - b) Mostre que as variáveis não são independentes.
  - c) Calcule  $P(X > Y)$ .
  - d) Calcule  $P(X = 2Y)$ .
  - e) Obtenha as funções probabilidade condicionadas.
14. O número de jogadores suplentes disponíveis que uma dada equipa amadora de futebol pode utilizar em cada jogo é uma variável aleatória  $X$ , enquanto o número dos utilizados é uma outra variável aleatória  $Y$ . A função de probabilidade conjunta é dada por,

$$f(x, y) = \frac{1}{15} \quad \text{para } x=0, 1, 2, 3, 4 \text{ e } y \text{ inteiro } 0 \leq y \leq x.$$

- a) Qual a probabilidade de num jogo serem utilizados todos os suplentes, sabendo que havia pelo menos um disponível?
  - b) Em média, quantos jogadores suplentes são utilizados por desafio?
15. Seja  $(X, Y)$  uma variável aleatória discreta que representa, para cada uma das famílias residentes numa determinada zona, o número de filhos da família ( $X$ ) e o número de assoalhadas do seu alojamento ( $Y$ ).

Conhece-se a função de probabilidade marginal de  $Y$

$y$	2	3	4	5
$f_Y(y)$	0.11	0.33	0.38	0.18

e a função de probabilidade conjunta de  $(X, Y)$  dada por,

$y \backslash x$	0	1	2	3	4
2	$a$	0.05	0.02	0.00	0.00
3	0.05	0.09	0.14	0.04	$c$
4	0.02	0.09	$b$	0.06	$a$
5	$c$	0.05	0.05	0.05	$d$

- a) Calcule a função de distribuição marginal de  $Y$ .
- b) Determine, justificando, o valor das constantes  $a$ ,  $b$ ,  $c$  e  $d$  e estude a independência das variáveis  $X$  e  $Y$ .
- c) Qual a percentagem de famílias dessa região com mais de dois filhos?

d) Calcule  $f_{X|Y=4}(x)$  e diga qual o seu significado quando  $x = 2$ .

16. Considere que o vector aleatório  $(X, Y)$  tem função densidade

$$f_{X,Y}(x, y) = 2 \quad (0 < x < 1; 0 < y < 1/2).$$

- Verifique que é uma função densidade.
- Obtenha as funções densidade marginais de  $X$  e de  $Y$ , e analise a independência.
- Calcule  $P(X > 1/2, Y < 1/4)$ .
- Calcule  $P(Y > X)$ .

17. Seja

$$f_{X,Y}(x, y) = x + y \quad (0 < x < 1; 0 < y < 1).$$

- Calcule  $P(X > 1/2, Y > 1/2)$ .
- Determine as funções densidade marginais, e analise a independência das variáveis.
- Obtenha as funções densidade condicionadas.

18. Uma empresa possui duas fábricas,  $A$  e  $B$ , que produzem o mesmo artigo. Considere-se a variável aleatória bidimensional contínua,  $(X, Y)$ , que representa a produção semanal (em toneladas) das fábricas  $A$  e  $B$ , respectivamente. Sabe-se que:

$$f_Y(y) = \frac{2(5y - y^2)}{33} \quad (1 < y < 4);$$

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{1}{5-y} \quad (1 < x < 6-y; 1 < y < 4; y \text{ fixo})$$

- Determine a função de distribuição marginal de  $Y$ .
- Numa semana em que a fábrica  $B$  produziu 2 toneladas qual é a probabilidade da fábrica  $A$  produzir mais de 3 toneladas?
- Determine, justificando, a função densidade de  $(X, Y)$ .
- Qual a percentagem de semanas em que a produção da fábrica  $A$  é superior à da fábrica  $B$ ?

19. Uma pessoa pretende viajar diariamente num comboio que parte entre as 7:20 e as 7:30. A variável aleatória que representa o período de tempo (em minutos) que decorre entre as 7:20 e o momento da partida,  $X$ , tem função densidade

$$f_X(x) = \frac{10-x}{50} \quad (0 < x < 10).$$

A hora de chegada da pessoa à estação é também aleatória, entre as 7:20 e as 7:30. A variável aleatória que representa o período de tempo (em minutos) que decorre entre as 7:20 e o momento da chegada da pessoa à estação,  $Y$ , tem distribuição dada por:

$$f_Y(y) = \frac{1}{10} \quad (0 < y < 10).$$

Admita a independência entre as duas variáveis aleatórias.

- a) Determine a função de densidade conjunta da variável  $(X, Y)$ .
- b) Calcule a percentagem de dias em que a pessoa viaja nesse comboio.
- c) Qual a probabilidade de a pessoa ter que esperar mais de 2 minutos até à partida desse comboio?

20. O João e a Joana combinaram encontrar-se, entre as 15 e as 16 horas, para estudar. Seja  $X$  o momento da chegada do João, e  $Y$ , o momento da chegada da Joana. Estas variáveis aleatórias são independentes, com funções densidade,

$$f_X(x) = 1 \quad (15 < x < 16); \quad f_Y(y) = 1 \quad (15 < y < 16).$$

- a) Obtenha a função densidade conjunta.
- b) Qual a probabilidade de ambos chegarem entre as 15:30 e as 16:00?
- c) Qual a probabilidade de o João chegar antes da Joana?
- d) Se o primeiro a chegar esperar apenas 15 minutos pelo outro, qual a probabilidade de estudarem juntos nesse dia?

21. Classifique as afirmações abaixo de verdadeiras ou falsas, justificando sucintamente:

- f) Conhecendo as distribuições marginais de  $X$  e de  $Y$  pode sempre calcular-se a distribuição conjunta de  $(X, Y)$ .
- g) Seja  $(X, Y)$  uma variável aleatória bidimensional com função de distribuição  $F_{X,Y}(x, y)$ . Se  $F_{X,Y}(0, 0) = 0$  pode-se garantir que  $P(X > 0) = 1$ .
- h) Se  $X$  e  $Y$  são variáveis aleatórias contínuas, tem-se  $P(X < 2Y) + P(X > 2Y) = 1$ .
- i) Considere a variável bidimensional  $(X, Y)$  e a respectiva distribuição conjunta. Se para um dado ponto  $(a, b)$  se tem  $f_{X,Y}(a, b) = f_X(a) \times f_Y(b)$  então as variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$  são independentes.
- j) Sendo  $(X, Y)$  uma variável bidimensional discreta com função probabilidade conjunta  $f(x, y)$  pode afirmar-se que, para todo o par  $(x, y)$ ,  $f(x, y) \leq P(X = x)$ .

## SOLUÇÕES

1. a)  $F(u) = 0$  ( $u < 0$ ),  $F(u) = u^2$  ( $0 \leq u < 1$ ),  $F(u) = 1$  ( $u \geq 1$ ); b) 0.21, 0.78125;  
c) contínua.
2. b) mista.
3. a)  $X(A) = \{1, 2, 3, 4\}$ ; b)  $X^{-1}[0, 5] = A = \{P, BP, BBBP, BBBP\}$ ;  
c) discreta;  $F(x) = 0$  ( $x < 1$ ),  $F(x) = 1/(n+1)$  ( $1 \leq x < 2$ ),  
 $F(x) = 2/(n+1)$  ( $2 \leq x < 3$ ), ...,  $F(x) = n/(n+1)$  ( $n \leq x < n+1$ ),  
 $F(x) = 1$  ( $x \geq n+1$ ).  
d)  $(n-2)/(n+1)$ .
4. a) 1/55; b) 4.
5. a)  $F(x) = 0$  ( $x < 1/2$ ),  $F(x) = 1 - 1/(4x^2)$  ( $x \geq 1/2$ ); b) 0.25.
6. a)  $f_X(x) = x/25$  ( $0 < x < 5$ ),  $f_X(x) = (10-x)/25$  ( $5 < x < 10$ ); b) 0.96;  
c)  $F_Y(y) = 0$  ( $y < -6$ ),  $F_Y(y) = (y+6)^2/200$  ( $-6 \leq y < 4$ ),  
 $F_Y(y) = (28y+4-y^2)/200$  ( $4 \leq y < 14$ ),  $F_Y(y) = 1$  ( $y \geq 14$ ); 0.18.
7. a)  $F_X(x) = 0$  ( $x < 0$ ),  $F_X(x) = 1 - e^{-x}$  ( $x \geq 0$ ); b) 0.5108;  
c)  $f_Y(0) = 0.4493$ ,  $f_Y(10) = 0.1572$ ,  $f_Y(20) = 0.3935$ .
8. a) V; b) F; c) V; d) F; e) V; f) F.
9. a) F; b) V; c) V; d) F; e) F.
10.  $F(x) = 0$  ( $x < 1$ ),  $F(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{2}$  ( $1 \leq x < 2$ ),  $F(x) = \frac{6x - x^2 - 7}{2}$  ( $2 \leq x < 3$ ),  
 $F(x) = 1$  ( $x \geq 3$ ); b) 0.25 ; c) 70.
11. a)  $F_X(x) = 0$  ( $x < 0$ ),  $F_X(x) = 0.20$  ( $0 \leq x < 1$ ),  $F_X(x) = 0.85$  ( $1 \leq x < 2$ ),  
 $F_X(x) = 1$  ( $x \geq 2$ );  $F_Y(y) = 0$  ( $y < 0$ ),  $F_Y(y) = 0.50$  ( $0 \leq y < 1$ );  
 $F_Y(y) = 0.86$  ( $1 \leq y < 2$ ),  $F_Y(y) = 1$  ( $y \geq 2$ ); b) 0.39; c) 0.43;  
d)  $f_{X|Y=1}(0) = 5/36$ ,  $f_{X|Y=1}(1) = 30/36$ ,  $f_{X|Y=1}(2) = 1/36$ ;  
e) não são independentes;
12. a)  $f_{Y|X=2}(0) = 4/6$ ,  $f_{Y|X=2}(1) = f_{Y|X=2}(2) = 1/6$ ; b) 0.66, 0.06, 0;  
c)  $F_T(t) = 0$  ( $t < 0$ ),  $F_T(t) = 0.66$  ( $0 \leq t < 1$ ),  $F_T(t) = 0.81$  ( $1 \leq t < 2$ ),  
 $F_T(t) = 0.96$  ( $2 \leq t < 3$ ),  $F_T(t) = 0.99$  ( $3 \leq t < 4$ ),  $F_T(t) = 1$  ( $t \geq 4$ ).
13. a)  $f_X(x) = (2x+5)/16$  ( $x = 1, 2$ );  $f_Y(y) = (2y+3)/32$  ( $y = 1, 2, 3, 4$ );  
c) 3/32; d) 3/32; e)  $f_{X|Y=y}(x) = (x+y)/(2y+3)$  ( $x = 1, 2$ ) e ( $y$  fixo,  $y = 1, 2, 3, 4$ );  
 $f_{Y|X=x}(y) = (x+y)/(4x+10)$  ( $y = 1, 2, 3, 4$ ) e ( $x$  fixo,  $x = 1, 2$ ).
14. a) 0.2857; b) 1.3333; c) 1.
15. a)  $F_Y(y) = 0$  ( $y < 2$ ),  $F_Y(y) = 0.11$  ( $2 \leq y < 3$ ),  $F_Y(y) = 0.44$  ( $3 \leq y < 4$ ),  
 $F_Y(y) = 0.82$  ( $4 \leq y < 5$ ),  $F_Y(y) = 1$  ( $y \geq 5$ ); b)  $a = 0.04$ ,  $b = 0.17$ ,  $c = 0.01$ ,  
 $d = 0.02$ , não são independentes ; c) 22% ; d)  $f_{X|Y=4}(0) = 2/38$ ,  
 $f_{X|Y=4}(1) = 9/38$ ,  $f_{X|Y=4}(2) = 17/38$ ,  $f_{X|Y=4}(3) = 6/38$ ,  $f_{X|Y=4}(4) = 4/38$ ;
16. b)  $f_X(x) = 1$  ( $0 < x < 1$ ),  $f_Y(y) = 2$  ( $0 < y < 1/2$ ), independentes; c) 0.25; d) 0.25;
17. a) 0.375;

- b)  $f_X(x) = x + 0.5$  ( $0 < x < 1$ );  $f_Y(y) = y + 0.5$  ( $0 < y < 1$ ), não são independentes;
- c)  $f_{X|Y=y}(x) = (x + y)/(y + 0.5)$  ( $0 < x < 1$ ) e ( $0 < y < 1$ ,  $y$  fixo);  
 $f_{Y|X=x}(y) = (x + y)/(x + 0.5)$  ( $0 < y < 1$ ) e ( $0 < x < 1$ ,  $x$  fixo).
18. a)  $F_Y(y) = 0$  ( $y < 1$ ),  $F_Y(y) = (15y^2 - 2y^3 - 13)/99$  ( $1 \leq y < 4$ ),  
 $F_Y(y) = 1$  ( $y \geq 4$ );  
 b)  $1/3$ ; c)  $f(x, y) = 2y/33$  ( $1 < x < 6 - y$ ,  $1 < y < 4$ ); d) 0.3636.
19. a)  $f(x, y) = (10 - x)/500$  ( $0 < x < 10$ ,  $0 < y < 10$ ); b)  $1/3$ ; c) 0.1707.
20. a)  $f(x, y) = 1$  ( $15 < x < 16$ ,  $15 < y < 16$ ); b) 0.25; c) 0.5; d) 0.4375.
21. a) F; b) F; c) V; d) F; e) V.