

# Família Exponencial

## Tópicos de Inferência Estatística

José Passos

ISEG-ULisboa

10 de Outubro de 2019



- Alguns dos modelos paramétricos estudados até aqui são casos particulares de uma classe mais geral de modelos designada família exponencial.
- Esta família tem um conjunto de propriedades que são extremamente úteis.

Definição: família exponencial com um parâmetro

Dizemos que  $\{f(x | \theta) : \theta \in \Theta\}$  é uma família exponencial se existem funções  $\eta(\theta)$ ,  $c(\theta)$ ,  $t(x)$  e  $h(x)$  tal que,

$$f(x | \theta) = h(x)c(\theta) \exp \{\eta(\theta)t(x)\}$$

onde  $\theta \in \Theta$ ,  $\{x : f(x|\theta) > 0\}$  não depende de  $\theta$ ,  $h(x) \geq 0$ ,  $t(x)$  não pode depender de  $\theta$ ,  $c(\theta) \geq 0$  e  $\eta(\theta)$  não pode depender de  $x$ .

Definição: família exponencial com um ou mais parâmetros

Dizemos que  $\{f(x | \theta) : \theta \in \Theta\}$  é uma família exponencial se existem funções  $\eta(\theta)$ ,  $c(\theta)$ ,  $t(x)$  e  $h(x)$  tal que,

$$f(x | \theta) = h(x)c(\theta) \exp \left\{ \sum_{j=1}^k \eta_j(\theta)t_j(x) \right\}$$

onde  $x \in \chi$  (que pode ser discreto ou contínuo),  $\theta \in \Theta$ , o suporte não depende de  $\theta$ ,  $h(x) \geq 0$ ,  $t_j(x)$  são funções reais dependentes apenas de  $x$  (não podem depender de  $\theta$ ),  $c(\theta) \geq 0$  e  $\eta_j(\theta)$  são funções reais dependentes apenas de  $\theta$  (não podem depender de  $x$ ).

## Notas:

- Se  $f(x | \theta)$  é da família exponencial o suporte,  $\{x : f(x | \theta) > 0\}$ , não depende de  $\theta$ ;
- Esta família tem como casos particulares a normal, exponencial, gama, qui-quadrado, beta, binomial, Poisson, geométrica, etc.;
- Para verificar se uma família de funções densidade ou funções probabilidade está na família exponencial, temos que identificar as funções  $h(x)$ ,  $c(\theta)$ ,  $\eta_j(\theta)$  e  $t_j(x)$  e mostrar que a família se pode expressar na forma anterior;
- As  $k$  estatísticas  $t_1, \dots, t_k$  são suficientes.

- Se  $\dim(\theta) = k$  diz-se que a família exponencial é completa
- Se  $\dim(\theta) > k$  os parâmetros não são identificáveis
- Se  $\dim(\theta) < k$  diz-se que a família exponencial é curvada
- Numa família exponencial curvada o estimador da máxima verosimilhança não é estatística suficiente pelo que a inferência deve ser condicionada numa estatística ancilária.
- Qualquer família paramétrica que seja suficientemente lisa (smooth) pode ser aproximada localmente, em torno do verdadeiro valor do parâmetro por uma família exponencial curvada.

## Exemplos:

- Distribuição binomial:

$$\begin{aligned}f(x \mid p) &= \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \\&= \binom{n}{x} (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p}\right)^x \\&= \binom{n}{x} (1-p)^n \exp\left\{\log\left(\frac{p}{1-p}\right)x\right\}.\end{aligned}$$

com  $k = 1$ ,  $h(x) = \binom{n}{x}$ ,  $c(p) = (1-p)^n$ ,  $\eta_1(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right)$  e  
 $t_1(x) = x$ .

- Distribuição Poisson:

$$\begin{aligned}f(x \mid \theta) &= \frac{e^{-\theta}\theta^x}{x!} \\&= \frac{1}{x!} e^{-\theta} \exp\{x \log \theta\}.\end{aligned}$$

com  $k = 1$ ,  $h(x) = 1/x!$ ,  $c(\theta) = e^{-\theta}$ ,  $\eta_1(\theta) = \log \theta$  e  
 $t_1(x) = x$ .

- Distribuição Normal:

$$\begin{aligned}f(x \mid \mu, \sigma^2) &= (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} \\&= (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right\} \exp\left\{\frac{\mu}{\sigma^2}x - \frac{1}{2\sigma^2}x^2\right\}.\end{aligned}$$

com  $k = 2$ ,  $h(x) = 1$ ,  $c(\mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right\}$ ,  
 $\eta_1(\mu, \sigma^2) = \mu/\sigma^2$ ,  $\eta_2(\mu, \sigma^2) = -1/(2\sigma^2)$ ,  $t_1(x) = x$  e  
 $t_2(x) = x^2$ .

## Teorema: momentos

Se  $X$  é v.a. com f.d.p. ou f.p. na família exponencial, tem-se,

$$E \left( \sum_{j=1}^k \frac{\partial \eta_j(\theta)}{\partial \theta_l} t_j(X) \right) = -\frac{\partial}{\partial \theta_l} \log c(\theta)$$

$$Var \left( \sum_{j=1}^k \frac{\partial \eta_j(\theta)}{\partial \theta_l} t_j(X) \right) = -\frac{\partial^2}{\partial \theta_l^2} \log c(\theta) - E \left( \sum_{j=1}^k \frac{\partial^2 \eta_j(\theta)}{\partial \theta_l^2} t_j(X) \right)$$

**Nota:** a vantagem deste resultado está no facto de os momentos poderem ser calculados com recurso a diferenciação, em vez de integração.

**Exemplo:** distribuição binomial,

- Para calcular  $E(X)$ , tem-se, do exemplo anterior,

$$\frac{d}{dp} \eta_1(p) = \frac{d}{dp} \log \frac{p}{1-p} = \frac{1}{p(1-p)}$$

$$\frac{d}{dp} \log c(p) = \frac{d}{dp} n \log(1-p) = -\frac{n}{1-p}$$

e portanto,

$$E \left( \frac{1}{p(1-p)} X \right) = \frac{n}{1-p}$$

donde se tira  $E(X) = np$ .

## Exemplo (cont.):

- Para calcular  $Var(X)$ , tem-se,

$$\frac{d^2}{dp^2} \eta_1(p) = \frac{2p - 1}{p^2(1-p)^2}$$

$$\frac{d^2}{dp^2} \log c(p) = -\frac{n}{(1-p)^2}$$

e portanto,

$$Var\left(\frac{1}{p(1-p)}X\right) = \frac{n}{(1-p)^2} - E\left(\frac{2p - 1}{p^2(1-p)^2}X\right)$$

onde se tira  $Var(X) = np(1-p)$ .

Definição: família exponencial com parâmetrização natural

A família exponencial é por vezes parametrizada do seguinte modo,

$$f(x \mid \eta) = h(x)c^*(\eta) \exp \left\{ \sum_{j=1}^k \eta_j t_j(x) \right\}$$

O conjunto

$$\mathbb{N} = \left\{ \eta = (\eta_1, \dots, \eta_k) : \int_X h(x) \exp \left( \sum_{j=1}^k \eta_j t_j(x) \right) dx < \infty \right\}$$

designa-se espaço parâmetro natural da família.

**Exemplo:** distribuição binomial:

- Espaço parâmetro:  $\Theta = \{p : 0 < p < 1\}$
- Espaço parâmetro natural:  $\aleph = \{\eta_1 : -\infty < \eta_1 < +\infty\}$   
onde  $\eta_1 = \eta_1(p) = \log \frac{p}{1-p}$ . Na parametrização natural tem-se,

$$f(x \mid \eta_1) = \binom{n}{x} (1 + e^{\eta_1})^{-n} \exp \{\eta_1 x\}.$$

**Exemplo:** distribuição normal:

- Espaço parâmetro:

$$\Theta = \{(\mu, \sigma^2) : -\infty < \mu < +\infty, 0 < \sigma^2 < +\infty\}$$

- Espaço parâmetro natural:

$$\mathbb{N} = \{(\eta_1, \eta_2) : -\infty < \eta_1 < +\infty, -\infty < \eta_2 < 0\} \text{ onde } \eta_1 = \mu/\sigma^2 \text{ e } \eta_2 = -1/(2\sigma^2)$$

## Corolário:

Se  $X$  é v.a. com f.d.p. ou f.p. na família exponencial com parâmetro natural  $\eta_1 = \eta_1(\theta)$ , tem-se (para simplificar e sem perda de generalidade vamos fazer  $k = 1$  e  $\dim(\theta) = 1$ ),

$$E(t_1(X)) = -\frac{d}{d\eta_1} \log c(\eta_1)$$
$$Var(t_1(X)) = -\frac{d^2}{d\eta_1^2} \log c(\eta_1)$$

**Nota:** a parametrização natural simplifica o cálculo dos momentos da estatística  $t_1(X)$ .

- Dada uma amostra casual de dimensão  $n$ , a f.d.p. ou f.p.  $f(x_1, \dots, x_n)$ , está na família exponencial se,

$$f(x_1, \dots, x_n | \theta) = c(\theta)^n \left( \prod_{i=1}^n h(x_i) \right) \exp \left\{ \sum_{j=1}^k \eta_j(\theta) \sum_{i=1}^n T_j(x_i) \right\}$$

- Fazendo  $T_j(x) = \sum_i^n T_j(x_i)$ , as v.a.'s  $T_j(X)$ ,  $j = 1, \dots, k$  designam-se estatísticas naturais,

$$f(x_1, \dots, x_n | \theta) = c(\theta)^n \left( \prod_{i=1}^n h(x_i) \right) \exp \left\{ \sum_{j=1}^k \eta_j(\theta) T_j(x) \right\}$$

Teorema: distribuição conjunta de  $T_j(X)$

A distribuição conjunta de  $T_1(X), \dots, T_k(X)$  é da família exponencial com parâmetro natural  $\eta_1(\theta), \dots, \eta_k(\theta)$

# Bibliografia

- Casella and Berger (2002), *Statistical Inference*, 2nd Edition, Duxbury (pags. 111-116).